

Kardiochirurgická klinika

Pozvánka k torakoskopické léčbě fibrilace síní

Vážený pane, vážená paní,

dostavte se dne

v 8:00 hod. k přijetí k operaci

na kardiologickou ambulanci Kardiochirurgické kliniky (přízemí budovy D2).

V případě nemoci (i nachlazení) odvolejte prosím termín operace, budete objednáni na jiný termín.

Ještě před přijetím k operaci můžete určit, komu dáte souhlas s poskytnutím údajů o Vašem zdravotním stavu po telefonu. Vyberte si jakékoliv „HESLO“ – např. jméno, předmět, místo....., (minimálně šest písmen), při přijetí toto heslo uvedete do souhlasu s hospitalizací. Osobám, které se při telefonickém hovoru neprokážou tímto heslem, nebudou informace týkající se Vašeho zdravotního stavu poskytnuty.

Kontakty:

Monika Šestáková
Sekretariát - tel: 58 844 2344
Fax: 58 844 2377

Kardiochirurgická klinika
Ambulance – tel: 58 844 2357

Před operací je nutné doplnit spirometrické vyšetření, odběry HIV a HbSAg.

Pokud jste **diabetik**, doneste s sebou průkazku diabetika s vyjádřením diabetologa ohledně kompenzace Vašeho onemocnění (glykemický profil) a **výsledek glykovaného hemoglobinu HbA1c**. (v případě hodnoty vyšší než 60 je nutná kompenzace diabetu před operací – zavolejte si proto o nový termín).

Pokud užíváte některý z těchto léků, vysadíte ho prosím:

5 dní před přijetím – **Anopyrin** (Godasal, Aspirin, Vasopirin), **Ibustrin**, **Ticlid** (Tagren, Ipaton, Ticlopidin, Apo-Tic), **Plavix** (Trombex, Egitromb, Nofardom, Carder, Clopidep, Clopidogrel, Clopigamma, Clopithan, Cloroden, Defrozyp, Grepid, Hemafluid, Iscover, Kloptimar, Lofradyk, Lopigalel, Picturlop, Platarex, Plavocorin, Sarovex, Sudroc, Teclop, Tessyron, Trogran, Tuxedon, Vatoud, Zopya, Zylagren, Zyllt), Efient, **Brilique**

7 dní před přijetím - **Warfarin**, **Lawarin** – po dohodě s ošetřujícím lékařem převedení na injekce nízkomolekulárního heparinu (LMWH)

24 – 48 hodin před přijetím – **Pradaxa**, **Eliquis**, **Xarelto** – vysadit

3 dny před přijetím – tricyklická antidepresiva (**Tofranil**, **Desipramine**, **Doxepin**, **Elavil** apod.)

2 – 3 týdny před přijetím – inhibitory MAO – **Jumex**, **Apo-Seleg**, **Cognitiv**, **Niar**, **Selegilin**.

Ostatní léky užívejte dále dle doporučení lékaře. Doporučujeme vzít si s sebou všechny léky, kteřé nyní užíváte, alespoň na 10 dní v originálním balení (NE do předpřipravených lékovek).

Prosíme, přineste si s sebou pevnou a čistou domácí obuv, hygienické potřeby a toaletní papír.

Vlastní pyžamo a ručník si z hygienických důvodů neberte.